



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE n. 08 del 27 giugno 2025

ANDAMENTO METEO	1
FENOLOGIA.....	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA.....	2
<i>CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)</i>	2
<i>TIGNOLA DELL'OLIVO (Prays oleae)</i>	3
<i>MARGARONIA (Palpita unionalis)</i>	4
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	5
<i>COTONELLO DELL'OLIVO (Euphillura olivina)</i> e <i>COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE (Sassetia oleae)</i>	5
<i>OCCHIO DI PAVONE (Spilocaea oleagina)</i> E <i>PIOMBATURA (Mycocentrospora cladosporioides)</i>	7

ANDAMENTO METEO

Le temperature elevate provocate dall'anticiclone africano, persistono nella regione accompagnate da elevati tassi di umidità. Cielo sereno e poco nuvoloso, con temperature di circa 6° superiori alla media del periodo. I temporali della scorsa notte hanno portato buoni apporti idrici in tutta la regione anche se in taluni casi accompagnati da forti grandinate e colpi di vento.

Per aggiornamenti in tempo reale si rimanda al link <https://www.osmer.fvg.it/home.php>

GRANDINE: laddove ci sono state forti grandinate intervenire tempestivamente con idrossido di rame a dosi di etichetta al fine di ridurre il rischio di diffusione della rogna.

FENOLOGIA

Siamo al 1° stadio dell'ingrossamento dei frutti in quasi tutte le zone monitorate. Le olivette nel corso di questa settimana non hanno subito sensibili cambiamenti. Lo stress idrico dei giorni scorsi ha rallentato la crescita del frutticino e, in casi di grave carenza idrica, si è verificata anche una cascola importante.



FIGURA 1. ACCRESCIMENTO DEL FRUTTO A MORUZZO (SINISTRA) E CANEVA (DESTRA)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

CIMICE MARMORATA ASIATICA (Halyomorpha halys)

Qualora non fosse ancora stato effettuato e verificata la presenza di neanidi, è necessario programmare un intervento di contrasto con prodotti a base di Deltametrina, efficace non solo contro questo parassita ma anche nel contenere popolazioni di Tignola, Margaronia, Cocciniglia e altri parassiti minori.

L'utilizzo di caolino/zeolite con adesivante e bagnante risulta essere utile come repellente all'insetto, oltre a proteggere la chioma dalle alte temperature.

Si ricorda che, se viene effettuato un trattamento con Acetamiprid contro tignola, esso può avere un effetto collaterale anche nei confronti della cimice.

Si raccomanda lo sfalcio dell'erba prima del trattamento per preservare i pronubi.



FIGURA 2. NEANIDI DI 2^a E 4^a GENERAZIONE



FIGURA 3. NEANIDE DI 4^a GENERAZIONE SU OLIVA

TIGNOLA DELL'OLIVO (Prays oleae)

Le catture del lepidottero nelle trappole a ferormoni continuano in quasi tutte le zone monitorate. Valutare assieme al consulente di riferimento in base alla storicità e alle catture attuali se intervenire nei prossimi giorni con:

- Azadiractina
- *Bacillus thuringiensis*
- Acetamiprid (max 2 interventi/anno, azione collaterale anche nei confronti della cimice asiatica marmorata e cocciniglia mezzo grano di pepe)
- Spinetoram (max 1 intervento/anno, utilizzabile fino al 30/12/2025)

Si raccomanda lo sfalcio dell'erba prima del trattamento per preservare i pronubi.

Di seguito riportiamo le catture di questa settimana:

Data	Provincia	Comune	N. Catture
23/06/2025	UD	Nespolo	4
23/06/2025	UD	Cividale	17
23/06/2025	UD	Gemona	8



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

23/06/2025	UD	Majano	4
23/06/2025	UD	Faedis*	7
23/06/2025	UD	Rive d'Arcano*	3
23/06/2025	UD	Pozzuolo*	16
23/06/2025	UD	Castions di St.*	0
23/06/2025	UD	Latisana*	0
23/06/2025	UD	Povoletto*	3
23/06/2025	UD	Remanzacco*	0
23/06/2025	PN	Pinzano	0
23/06/2025	PN	Polcenigo	0
23/06/2025	PN	Caneva	16

(*) Punti di monitoraggio ERSa

Temperature superiori ai 30°C possono provocare la devitalizzazione delle uova e delle giovani larve. Nell'oliveto sono presenti numerosi nemici naturali della tignola (predatori e parassitoidi). L'intervento insetticida va quindi valutato attentamente anche in funzione del carico della pianta: se la produzione è già scarsa, il danno da tignola può risultare problematico. Invece, il danno può essere tollerato se le piante hanno elevata carica di produzione.



In questo momento, l'intervento con trattamenti fitosanitari contro la tignola dell'olivo e la cimice asiatica marmorata non solo controlla questi parassiti diretti, ma aiuta anche a contenere patogeni minori che possono essere presenti nell'oliveto.

MARGARONIA (*Palpita unionalis*)

Sebbene le catture degli adulti risultino contenute, sui giovani germogli si riscontrano danni provocati dalle larve del lepidottero. Erodendo gli apici, la Margaronia ostacola la normale crescita dei germogli, influenzando lo sviluppo complessivo della pianta. Risulta particolarmente pericolosa nei giovani impianti.

Gli interventi contro la tignola e la Cimice asiatica contengono la presenza del lepidottero.



FIGURA 4. DETTAGLIO DELLA LARVA DI MARGARONIA (SINISTRA) E DANNO DELLA LARVA SU APICE DEL GERMOGLIO (DESTRA)

MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)

Negli areali monitorati non si riscontra una significativa presenza di mosca.

COTONELLO DELL'OLIVO (Euphillura olivina) e COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE (Sassetia oleae)

In molte zone monitorate si è evidenziata la presenza di questi due parassiti. Entrambi, oltre al danno diretto sugli organi della pianta, producono melata. Si osservano quindi in prossimità degli attacchi le fumaggini, simili a degli imbrattamenti nerastri. La presenza di formiche è un chiaro indicatore della presenza di melata.

Si può intervenire con un'adeguata potatura di sfoltimento per favorire l'insolazione interna della chioma, inoltre, trattamenti insetticidi e antifungini possono ridurre l'impatto.



FIGURA 5. COTONELLO DELL'OLIVO IN DETTAGLIO SU FRUTTICINI IN OLIVETO DI PINZANO (PN)




FIGURA 6. COTONELLO, COCCINIGLIA E UNA FORMICA A PINZANO (PN)



FIGURA 7. FUMAGGINE SU RAMI DI OLIVO PROVOCATA DA COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE A CANEVA (PN)

OCCHIO DI PAVONE (Spilocaea oleagina) E PIOMBATURA (Mycocentrospora cladosporioides)

Qualora gli attacchi su foglie di piombatura fossero importanti è possibile effettuare trattamenti a base di prodotti rameici. Per quanto riguarda la difesa contro occhio di pavone, in caso di necessità è possibile intervenire con prodotti a base di rame, o in alternativa con prodotti specifici a base di Dodina, IBE (Difenoconazolo, Tebuconazolo), Strobilurine (Pyraclostrobin, Azoxystrobin, Trifloxistrobin), Fosfonato di potassio o *Bacillus subtilis*.

Si ricorda di rispettare il limite 4 Kg di rame per ettaro annui.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSa 338-9385559, 334-6564626