

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA DELL'OLIVO PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE n. 8 del 26 giugno 2026

Sommario

ANDAMENTO METEO.....	1
FENOLOGIA	2
SITUAZIONE FITOSANITARIA	3
CIMICE MARMORATA ASIATICA (<i>Halyomorpha halys</i>).....	3
OCCHIO DI PAVONE (<i>Spilocaea oleagina</i>).....	4
TIGNOLA DELL'OLIVO (<i>Prays oleae</i>).....	4
MOSCA DELL'OLIVO (<i>Bactrocera oleae</i>)	5
GESTIONE AGRONOMICA	5
STRESS TERMICO DELLE DRUPE	5



Si ricorda che mercoledì 01 luglio 2026 alle ore 16:00 presso la sede del Consorzio Produttori Olio EVO FVG in via A. Malignani, 26 a Martignacco (UD) si terrà l'incontro tecnico **"LA GESTIONE FITOSANITARIA IN OLIVETO: FOCUS SULLA MOSCA DELL'OLIVO"** con la partecipazione di Michele Morten – Fondazione E. Mach, San Michele all'Adige (TN) e Gianluca Gori – ERSA FVG → PER REGISTRARTI [CLICCA QUI](#)

ANDAMENTO METEO

Forte ondata di calore per il posizionamento di un robusto anticiclone subtropicale. Giornate caratterizzate da cielo sereno e poco nuvoloso, con temperature in forte aumento su tutta la regione. Durante il fine settimana incremento termico con picchi di **36-38 °C** nelle aree di pianura e collina. Temperature con valori eccezionalmente alti e superiori alle medie stagionali.



All'inizio del mese di luglio delle correnti più fresche entreranno attraverso le Alpi e porteranno come effetto un peggioramento del tempo, aumento dell'instabilità e probabilmente dei fenomeni estremi (forti raffiche di vento e grandinate).

FENOLOGIA

Prosegue l'accrescimento delle olive, siamo allo stadio di ingrossamento della drupa. Tutti i siti di monitoraggio presentano la fase fenologica della scala BCCH tra 70 e 72.



Foto 1 e 2. Varietà Bianchera a Polcenigo (PN) e a Majano (UD)



Foto 3 e 4. Varietà Leccino a Montereale Valcellina (PN) e a Cividale (UD)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

CIMICE MARMORATA ASIATICA (*Halyomorpha halys*)

Di seguito si riportano i dati relativi alle catture campionate nell'ultima settimana:

Provincia	Comune	23/06/2026
UD	Cividale	40 adulti + 1 neanide
UD	Moruzzo	8 adulti + 22 neanidi
PN	Caneva	64 adulti + 2 nenanidi

In quasi tutte le diverse zone monitorate si sta registrando nuovamente la schiusa delle uova di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e la comparsa delle neanidi (di 1^a e 2^a età).

Si può intervenire attraverso:

- **Strategia con insetticida:** Per un'azione abbattente su neanidi è possibile utilizzare **Piretro** naturale.
- **Strategia preventiva:** l'applicazione di caolino, zeolite oppure miscele dei due, con aggiunta di un adesivante, si rivela efficace per ostacolare le ovideposizioni degli adulti.

Si raccomanda lo sfalcio dell'erba prima del trattamento per preservare i pronubi



Foto 5. Stadi di sviluppo *Halyomorpha halys*



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

*OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleagina*)*

In considerazione delle temperature massime eccezionalmente elevate previste per l'intero fine settimana, si consiglia di sospendere gli interventi con prodotti fitosanitari a base di rame a contrasto dell'occhio di pavone. L'applicazione del rame in condizioni di forte insolazione e stress termico comporta un elevato rischio di **fitotossicità** sulla vegetazione e sui frutticini in accrescimento.

*TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)*

Prosegue l'attività di monitoraggio sul territorio regionale di questo fitofago. Le catture risultano in generale più contenute rispetto all'anno precedente.

Di seguito riportiamo le catture di questa settimana:

Data	Provincia	Comune	N. di catture
23/06/2026	UD	Lestizza	1
23/06/2026	UD	Moruzzo	2
23/06/2026	UD	Gemona	17
23/06/2026	UD	Cividale	16
23/06/2026	UD	Castions di S.	0
23/06/2026	UD	Pozzuolo	0
23/06/2026	UD	Povoletto	8
23/06/2026	UD	Faedis	0
23/06/2026	UD	Osoppo	0
23/06/2026	UD	Rive d'Arcano	1
23/06/2026	PN	Caneva	1
23/06/2026	PN	Polcenigo	1
23/06/2026	PN	Montereale V.	0

Le catture del lepidottero in alcune zone monitorate ha raggiunto il picco del volo della generazione carpo-faga. In agricoltura biologica l'utilizzo del ***Bacillus thuringiensis*** sulla popolazione carpo-faga ha una azione limitata al breve periodo che va dalla schiusura delle uova a prima che le larve penetrino nei frutti. Effettuare il trattamento nelle ore serali.



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

*MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)*

Le temperature massime diffusamente superiori ai 35 °C associate alla scarsa umidità dell'aria limiteranno la presenza della mosca dell'olivo, ma potrebbero causare stress idrico e potenziale cascola nei frutticini sulle piante in asciutto.

È iniziato il monitoraggio dell'insetto: al momento le catture non sono tali da consigliare particolari trattamenti ma è possibile prepararsi ad installare le trappole per la cattura massale entro fine mese nei propri oliveti.

GESTIONE AGRONOMICA

STRESS TERMICO DELLE DRUPE

È consigliato monitorare lo stato idrico del terreno ed intervenire con irrigazioni per chi ha possibilità. È consigliato l'uso strategico di polveri di roccia (caolino, zeolite, bentonite) con l'aggiunta di un bagnante e di un adesivante, per schermare le drupe dagli stress termici. L'applicazione deve essere fatta quando le temperature giornaliere sono più miti. È possibile intervenire con una concimazione fogliare a base di estratti di alga, utili per sostenere lo sviluppo dei frutticini e contrastare lo stress termico della pianta.

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSAR 338-9385559