



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**
Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA DELL'OLIVO PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE n. 18 del 4 settembre 2026

Sommario

ANDAMENTO METEO.....	1
FENOLOGIA	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA	2
<i>MARGARONIA (Palpita unionalis)</i>	2
<i>MOSCA DELL'OLIVO (Bactrocera oleae)</i>	3

ANDAMENTO METEO

A partire da questo fine settimana un regime anticiclonico garantirà tempo caldo e asciutto con temperature tra 29°C e 32°C, una fase utile per effettuare campionamenti sulle olive e valutare l'infestazione della mosca dell'olivo, che sarà temporaneamente frenata dalle elevate temperature. Da metà della prossima settimana si verificherà un drastico cambio meteo a causa di una perturbazione nord-europea che porterà temporali diffusi e temperature sotto i 22-23°C. Questo aumento dell'umidità e il calo termico favoriranno la ripresa della mosca dell'olivo. Occorre quindi applicare eventuali trattamenti preventivi o repellenti prima delle precipitazioni e pianificare interventi di copertura subito dopo la pioggia, non appena i terreni saranno di nuovo agibili.

FENOLOGIA

I frutti hanno completato l'accrescimento raggiungendo la dimensione massima tipica nella maggior parte delle varietà. Da questo momento in poi si osserverà il successivo viraggio del colore dell'epicarpo, che perde la tonalità verde scuro per schiarirsi verso il verde chiaro/giallastro.



Foto 1 e 2. Varietà Bianchera e Leccino a Polcenigo (PN)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

MARGARONIA (Palpita unionalis)

Nel monitoraggio settimanale è stato riscontrato un incremento dell'attività di Margaronia dell'olivo. Nelle trappole delle stazioni di monitoraggio c'è stato un aumento delle catture degli adulti e si è osservato un aumento di attacchi larvali sui germogli giovani. La problematica richiede particolare attenzione soprattutto nei giovani impianti, dove i danni ai germogli apicali possono compromettere lo sviluppo strutturale delle piante.

Negli oliveti giovani interessati dagli attacchi si consiglia di intervenire tempestivamente utilizzando *Bacillus thuringiensis*. Per garantire la massima efficacia del trattamento, è fondamentale acidificare la soluzione acquosa ed effettuare l'applicazione rigorosamente nelle ore serali, evitando così la degradazione del prodotto dovuta ai raggi solari e assicurando una bagnatura uniforme di tutta la chioma.

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Di seguito si riportano le tabelle delle catture settimanali di adulti di mosca dell'olivo e il monitoraggio settimanale delle olive per l'infestazione attiva e dannosa:

Prov.	Comune	29 ^a settimana	30 ^a settimana	31 ^a settimana	32 ^a settimana	33 ^a settimana	34 ^a settimana	35 ^a settimana	36 ^a settimana
UD	Cividale	0	0	3 m	0	0	0	0	0
UD	Gemona	3 f + 10 m	2 f + 4 m	0	0		1 m	0	0
UD	Majano	0	1 m	1 m	1 f	0	0	0	0
UD	Moruzzo	0	2 m	1 m	0	1m	0	0	0
UD	Nespolo	2 m	1 m	4 f + 4 m	0	0	1 m	1 f	1 m
UD	Nimis	0	5 m	2 m	1 m	2f+3m	0	6	7 m
UD	Caneva	1 m	0	1 f + 1 m	0	0	0	0	1 m
PN	Polcenigo	0	0	1 f + 1 m	2 m	0	0	1 m	1 m
PN	S. Quirino	2 f + 6 m	1 f + 4 m	4 f + 7 m	0	1f	0	0	1 m
UD	Osoppo	2 f + 1 m	0	1 m	0	0	0	2 m	5 m
UD	Pozzuolo	1 m	1 f	1 m	0	0	0	0	0
UD	Faedis	0	2 f + 1 m	1 f + 1 m	0	0	0	2 m + 1 f	0
UD	Povoletto	2 f	0	1 f	0	0	1	0	0
UD	Rive d'Arc.	0	2 m	1 f + 1 m	0	0	0	0	0
UD	Latisana	1 f + 1 m	1 m	0	0	0	0	0	0
UD	Castions di S.	0	1 m	0	1 m	1 m	0	0	1 m
UD	Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0

Comune	n° catture mosca	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTA ZIONE ATTIVA	% INFESTA ZIONE DANNOS A	% MORTALITA' I e II età
Cividale	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
Moruzzo	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Majano	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Nespolo	1	5	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
Gemona	0	2	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	3	2
Nimis	7	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Caneva	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Polcenigo	1	4	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
S. Quirino	1	3	0	0	3	0	3	0	4	0	2	0	0	6	6
Rive D'Arc.	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Osoppo	5	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Povoletto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faedis	0	3	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	2	3
Premariacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozzuolo	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1



**CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)
P. IVA: 03075970305
PEC: olioevofvg@pec.it
Cod. SDI: JKKZDGR
Mail: info@oliofvg.it
Cell: 327 6574870
Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

Castions S.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Latisana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I monitoraggi territoriali settimanali indicano una situazione complessivamente sotto controllo; il raggiungimento o il superamento della soglia di intervento è stato infatti rilevato solo in un numero limitato di stazioni.

Si consiglia di proseguire con l'impiego di esche proteiche attivate con Spinosad (max. 8 interventi/anno) e il ripristino dell'applicazione di prodotti ad azione repellente e protettiva a base di polveri di roccia (caolino/zeolite).

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi

Servizio tecnico SISSAR 327-6574870

Per ERSA 338-9385559